СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

03.02.2020

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Биовит

(организация-разработчик: ООО ПО «Сиббиофарм»,
Россия, 633004, г. Бердск, Новосибирская обл., ул. Химзаводская, д. 11)

Номер регистрационного удостоверения:
35-3-11.17-3876№ ПВР-3-31.12/02818

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Биовит
международное непатентованное наименование: хлортетрациклин.

2. Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.

Биовит выпускают в трех дозировках: Биовит-80, Биовит-120 и Биовит-200, которые содержат в 1 кг в качестве действующего вещества хлортетрациклин в форме гидрохлорида – 80, 120 и 200 г соответственно, а в качестве вспомогательных веществ: мел или поваренную соль и муку пшеничную.

3.Лекарственный препарат по внешнему виду представляет собой однородный порошок от светло-серого до коричневого цвета с зеленоватым оттенком. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год с даты производства. Запрещается применять Биовит после истечения срока годности.

4. Биовит выпускают расфасованным по 1, 5, 10 кг в пакетах из полиэтиленовой пленки и по 20 кг в полиэтиленовых мешках, вложенных в бумажные мешки или тканые мешки из полипропилена. Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Биовит хранят в закрытой упаковке производителя, в защищённом от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от минус 20°С до 37°С.

6. Биовит следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Биовит относится к антибактериальным препаратам группы тетрациклинов.

10. Хлортетрациклин – действующее вещество Биовита – активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе стафилококков, стрептококков, эшерихий, сальмонелл, пастерелл.

Механизм бактериостатического действия антибиотика заключается в подавлении синтеза белка в микробной клетке на рибосомальном уровне. При пероральном введении антибиотик постепенно всасывается из желудочно-кишечного тракта, достигая максимальных концентраций через 4 часа после введения. При постоянном поступлении хлортетрациклина с кормом его концентрация поддерживается на терапевтическом уровне в течение всего периода лечения. Хлортетрациклин частично метаболизируется в печени и выводится из организма с фекалиями и мочой.

Биовит по степени воздействия на организм относится к малоопасным соединениям (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Биовит назначают телятам, поросятам, цыплятам, утятам, индюшатам с лечебной целью при пастереллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, бронхопневмонии, а также при других заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к хлортетрациклину микроорганизмами.

12. Противопоказанием к применению Биовита является индивидуальная повышенная чувствительность животных к антибиотикам тетрациклинового ряда, а также тяжелые нарушения функции печени и почек. Запрещается применять препарат животным с развитым рубцовым пищеварением и курам-несушкам, яйца которых предназначены в пищу людям.

13. При работе с Биовитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом необходимо пользоваться спецодеждой и индивидуальными средствами защиты - респиратором, защитными очками, перчатками; обеспечить вентиляцию рабочих и складских помещений. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или со слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к тетрациклинам следует избегать прямого контакта с Биовитом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не допускается применение препарата беременным животным и в период лактации.

15. Биовит применяют с кормом групповым методом или индивидуально один раз в сутки в течение 5-10 дней.

Суточные дозы препарата в граммах на одно животное представлены в таблице:

Вид животного	Биовит-80	Биовит-120	Биовит-200
Поросята 5-10-дневного возраста	0,75	0,5	0,3
Поросята 11-30-дневного возраста	1,5	1,0	0,6
Поросята 31-60-дневного возраста	3,0	2,0	1,2
Поросята 61-120-дневного возраста	7,5	5,0	3,0
Телята 5-10-дневного возраста	5,0	3,33	2,0
Телята 11-30-дневного возраста	6,0	4,0	2,4
Телята 31-60-дневного возраста	8,0	5,33	3,2
Цыплята, утята, индюшата (на 1 кг массы птицы)	0,63	0,41	0,25

16. При применении Биовита в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты.

17. Препарат в дозах, превышающих лечебную в 10 и 20 раз, при однократном применении нетоксичен для сельскохозяйственных животных и птиц. В случае многократной передозировки у животных могут наблюдаться рвота, расстройство функции желудочно-кишечного тракта, угнетение, отказ от корма.

18. Одновременно с Биовитом не рекомендуется применять антациды, каолин, бактерицидные антибиотики, а также препараты, содержащие железо, магний, кальций и алюминий. Биовит совместим с биологически активными веществами и другими компонентами комбикормов, премиксов и мультиэнзимных композиций.

19. Особенностей действия при начале введения препарата и при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушения интервала между введениями препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

21. Убой поросят и телят на мясо разрешается не ранее чем через 12 суток, цыплят, утят и индюшат – не ранее чем через 10 суток после последнего применения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО ПО «Сиббиофарм», Россия, 633004, г. Бердск, Новосибирская область, ул. Химзаводская, д. 11/2, 11/5, 11/6.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО ПО «Сиббиофарм», Россия, 633004, г. Бердск, Новосибирская область, ул. Химзаводская, д. 11.