Инструкция

по применению ветеринарного препарата «Кобакто Бел»

Общие сведения

1.1 Кобакто Бел (Cobacto Bel).

1.2 Препарат представляет собой маслянистую суспензия от белого до желтого цвета.

В 1,0 см3 суспензии содержится 25 мг цефкинома (в виде сульфата).

1.3 Препарат выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 50,0, 100,0, 200,0 см3.

1.4 Хранят препарат по списку «Б» в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 до плюс 25 С.

Срок годности препарата 1 год от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

Фармакологические свойства

2.1 Цефкином, входящий в состав препарата относится к цефалоспоринам IV поколения, характерной особенностью которых является высокая устойчивость к воздействию пенициллиназ и β -лактамаз.

2.2 Механизм действия препарата заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки микроорганизмов.

2.3 Цефкином обладает широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcii spp., Streptococcus spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Serratia marcescens, Haemophilus spp., Actinomyces pyogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Actinobacillus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae и др.

2.4 Минимальная ингибирующая концентрация после внутримышечного введения против большинства бактерий наблюдается уже через 5 мин. и остается таковой в течение 24 ч.

Цефкином выводится из организма в неизменном виде преимущественно почками (84-95%,).

Препарат малотоксичен.

Порядок применения препарата

3.1 Препарат применяют для лечения бактериальных инфекций у КРС, свиней, лошадей, кошек, собак, кроликов, вызванных грамположительными и грамотрицательными бактериями, чувствительными к цефкиному.

3.2 Крупному рогатому скоту при всех заболеваниях препарат вводят глубоко внутримышечно в дозе 2,0 см3 на 50,0 кг массы тела.

- при пастереллезе, панарициях, язве копытной подошвы, гнойном пододерматите, некробациллезе между пальцами копыта применять один раз в сутки на протяжении 3-5 дней.
- при мастите и остром мастите, сопровождающимся ухудшением общего состояния животного - один раз в сутки на протяжении 2 дней.
- при септицемии у телят: 2,0 – 4,0 см3 на 50 кг массы тела глубоко внутримышечно один раз в сутки на протяжении 3-5 дней (в зависимости от тяжести заболевания).

3.3 Свиньям препарат вводят глубоко внутримышечно в дозе 2,0 - 4,0 см3 на 50 кг массы тела.

- при респираторных заболеваниях, вызванных Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae. Streptococcus suis и др.бактериями, чувствительными к цефкиному применять один раз в сутки на протяжении 3 дней.
- при синдроме ММА с вовлечением Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp. и др. бактериями, чувствительными к цефкиному, препарат применяют один раз в сутки на протяжении 2 дней.
- при роже и кожных заболеваниях свиней препарат применяют один раз в сутки в дозе 4,0 см3 на 50,0 кг массы на протяжении 3 дней.
- при бактериальных инфекциях у поросят, вызванных Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. и др. (менингиты, артриты) применять один раз в сутки в дозе от 2,0 до 4,0 см3 на 50,0 кг массы ежедневно на протяжении 3-5 дней (в зависимости от тяжести заболевания).

3.4 Для лечения заболеваний взрослых лошадей, вызванных Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, инфекций, вызванных Escherichia coli у жеребят, препарат применяют в дозе 2,0 – 4,0 см3 на 50,0 кг массы один раз в сутки в течение 2 – 5 дней.

3.5 Собакам, кошкам, кроликам препарат применяют в дозе 1,0 см3 на 10,0 кг массы один раз в сутки в течение 2 – 5 дней.

3.6 Перед применением содержимое флакона следует тщательно встряхнуть до получения однородной массы.

3.7 Не применять животным, у которых имеется аллергия к цефкиному или другим β - лактамным антибиотикам.

Не применять совместно с аминогликозидами и фуросемидом.

3.8 Рекомендуется чередовать места инъекций.

В редких случаях применения препарата может привести к местной тканевой реакции.

Повреждение ткани в месте инъекции восстанавливается через 10-15 дней.

3.9 При соблюдении указанных доз побочных действий не установлено.

3.10 Убой КРС на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток, свиней - не ранее, чем через 4 суток.

В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока, мясо используют на корм плотоядным животным.

Молоко разрешается применять через 3 суток после последнего введения препарата.

Молоко, полученное ранее указанного срока после кипячения можно применять для кормления животных.

Меры предосторожности

4.1. Все работы с препаратом необходимо проводить в спецодежде.

4.2. Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией.

При подтверждении выявления отрицательно воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

Полное наименование производителя

6.1 Производственное унитарное предприятие «Гомельский завод ветеринарных препаратов» (246013, г. Гомель, пер. Технический, 1; тел./факс 8(0232)29-19-24).