ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата
«Травмол-форте»

1. Общие сведения

1.1. Травмол-форте (Travmol-forte).
1.2. По внешнему виду препарат представляет собой стерильную прозрачную жидкость желтоватого цвета.
1.3. Препарат в своём составе содержит потенцированные водно-спиртовые гомеопатические субстанции: арника горная (arnica montana) D2 - 4 $см^3$, зверобой продырявленный (hypericum perforatum) D2 – 2 $см^3$, багульник болотный (ledum palustre) D3 – 2 $см^3$, окопник лекарственный (symphytum officinale) D3 – 2 $см^3$, рута пахучая (ruta graveolens) D3 – 2 $см^3$, натрия хлорид – 0,9 г., вода для инъекций - до 100 г.
1.4. Травмол-форте выпускают расфасованным по 20 $см^3$ и 100 $см^3$ во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укреплёнными алюминиевыми колпачками. Флаконы по 20 $см^3$ упаковывают в индивидуальные картонные коробки. Вторичная упаковка флаконов по 100 $см^3$ не предусмотрена. Каждая единица фасовки снабжается инструкцией по применению.
1.5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от + 5^0C до +25 ^{0}C.
1.6. Срок годности препарата, при соблюдении условий хранения и транспортировки - 2 года с даты производства. Срок хранения препарата после вскрытия флакона не более 48 часов. Травмол-форте запрещается применять по истечении срока годности.

2. Фармакологические свойства

2.1. Травмол-форте относится к комбинированным гомеопатическим ветеринарным препаратам.
2.2. Входящие в состав препарата гомеопатические компоненты обладают противовоспалительным (противоотечным и обезболивающим) действием при открытых и закрытых травмах различных органов и тканей.
Арника горная (arnica montana) – Основное действующее вещество - арницин обладает сосудосуживающим, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием при травмах мягких тканей.
Багульник болотный (ledum palustre) содержит эфирные масла: ледол, палюстрол, цимол, геранилацетат. Которые оказывают антисептическое и ранозаживляющее действие при колотых, и рваных ранах.
Зверобой прдыроявленный (hypericum perforatum) содержит флавоноиды (гиперозид, рутин, кверцитрин, изокверцитрин и кверцетин), которые обладают антисептическим и обезболивающим действием при травматических поражениях центральной и периферической нервной системы и при повреждениях тканей, богатых чувствительными нервными окончаниями.
Окопник лекарственный (symphytum officinale). Основное действующее вещество – аллантоин оказывает регенерирующее, рано- и костнозаживляющее действие.
Рута пахучая (ruta graveolens) содержит алкалоид рутин, оказывающий ранозаживляющее действие при травмах суставов и сухожильно-связочного аппарата.
Активные компоненты, входящие в состав травмола-форте обладают синергидным действием.

3. Порядок применения

3.1. Травмол-форте применяют собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным в качестве противовоспалительного, обезболивающего и ранозаживляющего средства при травмах (колотые резаные и рваные раны, ушибы, растяжения мышц и связок).
3.2. Травмол-форте применяют подкожно или внутримышечно с интервалом 12-24 часа в следующей дозировке:
Собаки и кошки 0,1 $см^3$ /1кг массы животного.
Свиньи – 1,0 $см^3$/50 кг массы животного.
Крупный рогатый скот – 1,0 $см^3$/100 кг массы животного.
Лошади – 1,0 $см^3$/100 кг массы животного.
Курс лечения – от 1 до 5-и дней.
3.3. При наружных локализованных повреждениях, таких как резаные, колотые, рваные или операционные раны, ушибах, гематомах травмол-форте применяют подкожно вокруг повреждённого участка в пределах здоровых тканей.
При обширных наружных травмах либо при травмах внутренних органов травмол-форте применяют внутримышечно.
3.4. Следует избегать пропусков применения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозе и схеме применения.
3.5. При применении травмола-форте в соответствии с инструкцией побочных реакций и осложнений не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты (димедрол), проводят симптоматическое лечение.
3.6. Применение травмола-форте не исключает использование средств симптоматической и патогенетической терапии.
3.7. Продукцию животноводства в период лечения и после применения препарата разрешается использовать без ограничений.

4. Меры личной профилактики.

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общие требования по технике безопасности и личной гигиены.

5. Порядок предъявления рекламаций

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6. Полное наименование изготовителя

6.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕПРОВЕТ»,
140563, Российская Федерация, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 252.

Номер регистрационного удостоверения *6192-10-18-ЗПХ-Ф*